

Амбулаторная хирургия варикоза под местной анестезией

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент.

У вас диагностировано заболевание вен, требующее хирургического вмешательства. Далее мы хотели бы объяснить вам дальнейшую процедуру.

Процесс:

Уже сегодня мы предоставим вам пояснения по поводу операции, информационный лист с дополнительной информацией и список вопросов. Пожалуйста, прочтите их внимательно и по возможности ответьте на вопросы. Будут назначены необходимые лекарства и компрессионные чулки.

Пожалуйста, возьмите с собой в день операции заполненные документы, чулок и один шприц анти тромбоза.

В день операции:

Приходите в день операции в нашу клинику натощак, пунктуально и с сопровождающим лицом (для очень небольших вмешательств можно обойтись без сопровождающего).

Необходимо взять с собой документы, чулок и один шприц анти тромбоза. Варикозные вены будут отмечены, и вы получите первую инъекцию анти тромбоза. Основная местная анестезия вводится в виде нескольких уколов в ногу. После операции, которая обычно длится не более

30 минут, вы приходите в нашу послеоперационную палату.

Сопровождающий человек, которого вы привели с собой, будет следить за вами. Конечно, мы всегда доступны, если у вас есть какие-либо проблемы.

Выписка обычно возможна через 30-45 минут после окончания операции. В день операции также нельзя оставаться дома одному. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, с нами можно связаться в рабочее время по телефону 02943/4300, а затем по телефону 0151/26635859

Послеоперационное лечение:

Вы должны знать, что можете внести большой вклад в успех операции своим собственным поведением во время последующего ухода.

Наилучший результат может быть достигнут только в том случае, если врач и пациент работают вместе.

Уже после короткого периода отдыха после операции вы должны часто вставать, ходить и таким образом, также разрабатывать прооперированную ногу. В сидячем положении оперированную ногу следует приподнять и следить за тем, чтобы не защемить пах.

В конце операции вам наденут компрессионный чулок. Контрольный визит будет проведена в нашей клинике на следующий день после операции.

Амбулаторная хирургия варикоза под местной анестезией

Самостоятельно снять пластырь можно со второго дня после операции. Если требуется дополнительная защита, на рану можно наклеить новые пластыри, но это необходимо только в паху.

Вы должны вводить предписанные анти тромбозные инъекции в бедро один раз в день в течение семи дней после операции.

Вы должны постоянно носить компрессионные чулки в течение двух недель. Через две недели достаточно носить его в течение дня а через шесть недель в большинстве случаев уже не нужно носить компрессионные чулки. Примерно через десять дней после операции проводится еще одна проверка раны и снятия швов.

В первые две недели после операции нельзя поднимать тяжести и избегать управления автомобилем более 30 минут.

Принимать душ разрешается со второго дня. Пожалуйста, не принимайте ванну или душ с очень теплой водой. Однако раны следует только протирать, а не растирать.

Следует избегать длительных горячих ванн или саун в течение первых 6 недель, так как они приводят к серьезному расширению вен.

Вы должны избегать сильного солнечного света (также солярия) в области шрамов в течение примерно шести месяцев, чтобы не оказывать на них неблагоприятного воздействия (риск обесцвечивания).

Способность работать зависит от типа работы, которую вы делаете. Обычно вы снова можете работать через одну-две недели после процедуры.

Физическая активность может быть осторожно возобновлена примерно через две недели после операции и должна увеличиваться медленно.

Окончательная проверка проводится через шесть недель после операции. При необходимости оставшиеся боковые ветви варикоза можно удалить с помощью склеротерапии.

Мы надеемся, что смогли дать вам полезный обзор нашей запланированной процедуры и всегда доступны, если у вас есть какие-либо вопросы.

Если у вас есть дополнительные вопросы: пожалуйста, свяжитесь с нами!

[Ваша хирургическая клиника Балькенхоль.](#)

